



## EFICACIA DEL MEDICAMENTO

El aborto con mifepristona y misoprostol es muy seguro y tiene una eficacia del 95-98 % si se toma durante las primeras 12 semanas de embarazo.

## EN CASO DE QUE EL MEDICAMENTO NO FUNCIONARA



Repita el aborto repitiendo el aborto medicamentoso o sometiéndose a una aspiración manual endouterina (AME). Existe un riesgo muy pequeño de que se produzcan defectos congénitos si el embarazo continúa después de tomar misoprostol.



## INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Women HelpWomen

WEB: [HTTPS://WOMENHELP.ORG/](https://womenhelp.org/)

EMAIL: [INFO@WOMENHELP.ORG](mailto:info@womenhelp.org)

TWITTER: [@WOMENHELPORG](https://twitter.com/womenhelporg)

FACEBOOK: [WOMENHELPWOMENINTERNATIONAL](https://www.facebook.com/womenhelpwomeninternational)

MAMA Network: Mobilizing Activists around Medical Abortion (MAMA).

WEB: [WWW.MAMANETWORK.ORG](http://www.mamanetwork.org)



## ¿MI ABORTO FUE EXITOSO?

Aunque la mujer sienta que ya no está embarazada, es importante asegurarse de que el aborto haya sido exitoso. Las mujeres deben realizarse una ecografía 10 días después del aborto medicamentoso o una prueba de embarazo entre 3 y 4 semanas después del aborto.



En caso de que la **mujer no sangre, sangre poco** (menos que en la menstruación y sin coágulos) o siga teniendo **síntomas de embarazo** después de usar las pastillas, es probable que siga embarazada. Debe hacerse una ecografía lo antes posible para **comprobar si el embarazo continúa o no; si esto no es posible, puede volver a usar las pastillas.**



## DESPUÉS DEL ABORTO



Después del aborto, la mujer puede esperar un sangrado ligero durante 1-3 semanas, pero cada mujer es diferente.



Se recomienda a las mujeres que no se introduzcan nada en la vagina (tampones), no se bañen ni mantengan relaciones sexuales hasta que cese el sangrado abundante, aproximadamente durante dos días, después de un aborto con medicamentos.



**¡Una mujer puede quedar embarazada inmediatamente después de un aborto!** Si no quiere quedar embarazada inmediatamente, puede empezar a utilizar un método anticonceptivo eficaz para evitar un nuevo embarazo no deseado.

# ABORTO

## CON MIFEPRISTONA Y MISOPROSTOL (MÉTODO COMBINADO)





### ¿CÓMO FUNCIONA?

El aborto medicamentoso provoca un proceso similar al de un aborto espontáneo.



La mifepristona bloquea la progesterona, una hormona necesaria para mantener el embarazo, y también hace que el útero sea más receptivo al misoprostol.



El misoprostol provoca contracciones del útero, lo que da lugar a la expulsión del tejido del embarazo, coágulos y sangre.

### ¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE UTILIZAR PARA UN ABORTO SEGURO?



0 >>> 12 semanas

Se puede utilizar hasta 12 semanas, contando desde el primer día del último ciclo menstrual.



### ¿CÓMO SE ADMINISTRA PARA INDUCIR UN ABORTO SEGURO?



Una mujer necesitará 1 tableta de mifepristona (200 mg) más 4 tabletas de misoprostol (200 mcg cada una).



La mifepristona debe tomarse con un vaso de agua

24 horas después, la mujer puede tomar **4 pastillas de misoprostol por vía bucal**



entre la encía y la mejilla, **dos en el lado izquierdo y dos en el derecho**

Las cuatro pastillas deben dejarse en la boca durante aproximadamente **30 minutos** para que se disuelvan. Los restos pueden tragarse después.



### POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS



En las primeras 24 horas pueden aparecer los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, fiebre con o sin escalofríos, dolor de cabeza y/o mareos. Estos efectos secundarios no son peligrosos y desaparecerán en pocas horas.



### WHAT CAN BE EXPECTED AFTER USING THE MEDICATION?



Calambres y sangrado vaginal más intenso que durante la menstruación normal.



first 6 hours. En el 90 % de los casos, la expulsión del embarazo se produce durante las primeras 6 horas.



Cuanto más tiempo haya estado embarazada la mujer, más intensos pueden ser el sangrado y los calambres.




Los analgésicos se pueden tomar al mismo tiempo que la primera dosis de misoprostol. El **ibuprofeno** es el más eficaz. Se puede usar **paracetamol/acetaminofén** además.




### ¿CUÁLES SON LAS SEÑALES DE ALERTA (COMPLICACIONES)?



Calambres y sangrado vaginal más intenso que durante la menstruación normal. 



Fiebre alta (más de 39 grados centígrados) o 38 grados centígrados durante más de 24 horas. 



Dolor intenso que no se alivia con analgésicos unos días después de tomar los medicamentos.



Flujo vaginal anormal y maloliente.

### ¿QUÉ HACER EN CASO DE COMPLICACIONES?



**Acuda inmediatamente a un centro de salud.**

En caso de emergencia médica, **el personal médico tiene la obligación de atender a la persona de manera oportuna.** El tratamiento para las complicaciones es el mismo que para las complicaciones después de un aborto espontáneo. **No es posible distinguir entre un aborto espontáneo y un aborto inducido con misoprostol.** Una mujer que necesite atención médica puede decir que ha tenido un aborto espontáneo.

