



NGUVU YA DAWA

Muungano wa Mifepristone na Misoprostol una nguvu zaidi ya asilimia 95 au 98% bila ata lazima ya dawa zingine za kuongezwa.

NINI IFANYIKE IKIWA MIMBA AIKUTOKA?



Mwanamke anaweza rudilia matumizi ya dawa mifeprestoni na misoprostoli au anaweza kimbilia kufanya aspiration (kubulula).

Kuna matokea madogo sana ya mtoto aliye ndani ya tumbo kuharibika Kama ujauzito unaendelea baada ya kutumia dawa.



JE, MIMBA YANGU IMEFANYIKIWA KUTOKA ?

Hata ikiwa mwanamke anajisikia kwamba hana tena mimba, ni muhimu kuhakikisha kama kweli mimba ilitoka. Inabidi kufanya kipimo cha echographia, baada ya kutowa mimba kwa njia ya vidonge, au kipimo cha mimba baada ya inga 3 au 4 kwa kuhakikisha kama ilitoka kweli-kweli.



BAADA YA MIMBA KUTOKA



Baada ya mimba kutoka, mwanamke anaweza kuendelea kutoka damu kidogo kidogo kwa mda wa juma 1 au 3, lakini inafuatana na hali ya mwanamke. Ya maana ni kuhakikisha kama mimba inatoka bila tatizo.



Aupashwi kuingiza kitu chochote kile ndani ya uchi ya mwanamke wako (mfano pamba) au kufanya ile bain ya zaidi, au kufanya tendo la ndoa na mwanamke, mpaka ile damu iwe yenye kupunguka karibuni siku mbili (2) hivi kisha mimba kutoka kupitiya vidonge.



Mwanamke anaweza pata ingine mimba palepale baada mimba kutoka!

Kwa kuepuka kuebba mimba ya haraka baada ya mimba kutoka, nilazima kutafufa mpango wa uzazi uliyo bora.



CONTACTS

Women Help Women
WEB: [HTTPS://WOMENHELP.ORG/](https://WOMENHELP.ORG/)
EMAIL: INFO@WOMENHELP.ORG

TWITTER: @WOMENHELPORG
FACEBOOK: WOMENHELPWOMENINTERNATIONAL

MAMA Network: Mobilizing Activists around Medical Abortion (MAMA).
WEB: WWW.MAMANETWORK.ORG



ANWANI: SOSFEC: DRC/SUD_KIVU/UVIRA: QUARTIER KILIBULA AVEC LUNGHE III N° 35.
SIMU: +(243) 851728552, 97667819
FACEBOOK: SOSFEC ASBL
EMAIL: NTURUBIKANDI@GMAIL.COM / SOSFEMME.ENFANT @GMAIL.COM

UTOWAJI MIMBA KWA
KUTUMIA VIDONGE VYA
MIFEPRISTONE
NA MISOPROSTOL
(MUCHANGANYIKO)





INAFANYA JE (INATEMBEA JE) ?

Matumizi ya misoprostol inafanana moja kwa moja na ile ya mimba kuharibika.



MIFEPRISTONE MISOPROSTOL

Mifepristone uziuya progestérone, mboleo ambayo usaidia mimba kuendelea na kusadia kizazi kujitayarisha kupokea Misoprostol.



Vidonge nya Misoprostol vinaleta maumivu kidogo kidogo ndani ya kiungo cha uzazi ambaa husababisha kurasuka kwa colle, kufunguka na kuanza kutoka damu.

HADI KWA MDA GANI YANAWEZA KUTUMIKISHWA JUU YA UTOWAJI MIMBA UHAKIKA?



0 → 10 wili

Kwa wili 10 ya mwanzo ya mimba kwa kuanza kuhesabu siku yako ya mwisho ya kupata damu.



JINSI GANI UTUMIKISHE DAWA KWA KUTOA MIMBA KAMILI ?



MIFEPRISTONE 200mg MISOPROSTOL 200mg kila kimoja

Mwanamke atakuwa na lazima ya kidonge kimoja (1) cha Mifepristone ya 200 mcg na ingine ine (4) ya Misoprostol ya 200 mcg kila kimoja.



MIFEPRISTONE +

Mifepristone inapashwa kumezwu na kopo moja ya maji (verre moja).



Kisha saa 24, weka/tia
vidonge 4 vya misoprotsol
ndani ya kinywa.



Tiya vidonge mbili kwenye pembe ya meno na machafu yani mbili kushoto na mbili kuume



**Vidonge 4 vitabaki ndani ya kinywa
mda wa dakika 30** ukimeza mate tu hadi vimalizike, baada ya dakika hiso, mwanamke anaweza kunyuwa moji akimeza yale mabaki.



UWEZEKANO WA MATOEKO/VINYUME VINGINE

Baada ya masaa 24 kisha kutumia dawa (vidonge), hali kama hizi zinaweza zikafike : kichefuchefu, kutapika, kuharisha, homa ya 38°, kichwa kuuma na mchoko, dalili hiso siyo za kusumbua sana na zinaisha kwa masaa kidogo tu.



NINI INAWEZA TOKEA BAADA YA KUTUMIA MISOPROSTOL?



Maumivu mengi na kuvuja damu nyingi kupita damu ya kawaida.



Asilimia 90% za mimba, **hutoka bila shida mnamo ma saa 24**



Jinsi mimba inakomaa zaidi (kukuuwa), ndivyo hivyo mwanamke atavuja damu.



Mwanamke anaweza kunyuwa **ibuprofen au paracetamol** juu ya kupunguza maumivu.

ALAMA GANI ZA KUTATANISHA ?

Kutoka damu kupita kiosi (hadi unajaza cotexte 2 au 3 kwa saa moja zaidi ya saa 2 au 3 ya kufwatana)



Homa kali (zaidi ya 39°) au 38° kwa mda wa zaidi ya ma saa 24



Maumivu makali isiyomalizika ijapokuwa unakunyuwa dawa za kupunguza maumivu siku za kufuatana baada ya kukamata dawa

Kutokwa na vitu vibaya ndani ya uchi na vyenye harufu mbaya.

FANYIKE NINI IKIWA KUNA MATATIZO



Wende mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu

Ikiwa mwanamke ana lazima ya matunzo, mganga anapashwa kumtunza. Matunzo ya utoaji mimba kwa njia ya vidonge iliyosababisha matatizo inalingana sawasawa na yale ya mimba kuaribika. Ni vigumu kutofautisha mimba ambayo imearibika na ambayo litoka kupitia vidonge nya Mifepristone na Misoprostol. Inamaana kwamba mwanamke anapokuwa na lazima ya matunzo anawezasema kama mimba iliaribika.

