



EFFICACITÉ

DES MÉDICAMENTS

La méthode combinée Mifepri-
stone / Misoprostol est sûre et
efficace dans 95 à 98% des cas
durant les 10 premières semaines
de grossesse et **sans que des
soins médicaux additionnels ne
soient nécessaires.**

QUE FAIRE SI L'AVORTEMENT N'A PAS EU LIEU ?



La femme peut répéter la prise
des médicaments mifepri-
stone et misoprostol ou recourir à une
aspiration.
Il y a très peu de risques de
malformations du fœtus si la
grossesse continue après la prise
du médicament.



MON AVORTEMENT A-T-IL RÉUSSI ?

Même si la femme sent qu'elle n'est plus enceinte, il est
important de s'assurer que l'avortement a réussi. Il faut faire
une échographie après l'avortement médicamenteux, ou un
test de grossesse 3 à 4 semaines après l'avortement.



APRÈS L'AVORTEMENT



Après l'avortement, une femme peut continuer à
saigner légèrement pendant 1 à 3 semaines,
mais chaque femme est différente. Il faut
confirmer que l'avortement est réussi.



Il ne faut rien introduire à l'intérieur du vagin
(tampons), ni prendre de bain ou avoir des
relations sexuelles jusqu'à ce que les saignements
abondants diminuent, environ 2 jours après
l'avortement médicamenteux.



**Une femme peut tomber enceinte
immédiatement après un avortement!**
Pour éviter de retomber enceinte immédiatement,
si elle ne le souhaite pas, il faut utiliser un bon
moyen de contraception.



CONTACTS

Women Help Women
WEB: [HTTPS://WOMENHELP.ORG/](https://womenhelp.org/)
EMAIL: [INFO@WOMENHELP.ORG](mailto:info@womenhelp.org)

TWITTER: @WOMENHELPORG
FACEBOOK: WOMENHELPWOMENINTERNATIONAL

MAMA Network: Mobilizing Activists around Medical Abortion (MAMA).
WEB: WWW.MAMANETWORK.ORG

Trust for Indigenous Culture and Health (TICAH)
WEB: WWW.TICAHEALTH.ORG
EMAIL: LISTENING@TICAHEALTH.ORG
TWITTER: @YOURAUNTYJANE
FACEBOOK: AUNTY JANE HOTLINE

AVORTEMENT
MÉDICAMENTEUX
AVEC MIFEPRI-
STONE
PLUS MISOPRO-
STOL
(MÉTHODE COMBINÉE)





COMMENT ÇA MARCHE ?

Le Misoprostol induit un processus similaire à une fausse couche.



MIFEPRISTONE **MISOPROSTOL**
La Mifepristone bloque la progestérone, une hormone indispensable pour que la grossesse se poursuive, et permet à l'utérus d'être plus réceptif au Misoprostol.



Le Misoprostol provoque des contractions de l'utérus, qui causent l'expulsion des tissus de la grossesse, de caillots et des saignements.

JUSQU'À QUAND PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ POUR UN AVORTEMENT SÛR ?



0 >>> 10 weeks

Dans les 10 premières semaines de la grossesse en comptant depuis le premier jour des dernières règles.



COMMENT UTILISER LES MÉDICAMENTS POUR UN AVORTEMENT SÛR ?




La femme aura besoin d'un (1) comprimé de Mifepristone 200 mcg et quatre (4) comprimés de Misoprostol de 200 mcg chacun



La Mifepristone doit être avalé avec un verre d'eau.

24 heures plus tard, placer **4 comprimés de Misoprostol** par voie buccale



entre la gencive et la joue, **deux comprimés du côté gauche entre la gencive et la joue et deux comprimés du côté droit entre la gencive et la joue.**

Les 4 comprimés doivent être gardés dans la bouche durant 30 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dissous. Après ce temps, la femme peut avaler les restes



POSSIBLES EFFETS SECONDAIRES

Dans les 24 heures après la prise des médicaments, les symptômes suivants peuvent survenir: nausées, vomissements, diarrhée, fièvre de 38°, maux de tête et/ou malaises. Ces effets secondaires ne sont pas dangereux et disparaîtront après quelques heures.



QUE PEUT-IL SE PASSER APRES LA PRISE DU MISOPROSTOL ?



De fortes crampes et des saignements plus importants que ceux des règles.



Dans 90% des cas, **l'expulsion de la grossesse** se fait dans les premières 24 heures.



Plus une grossesse est avancée, plus la femme aura des saignements.



La femme peut prendre de l'**ibuprofen** ou du **panadol** pour soulager la douleur.



QUELS SONT LES SIGNES DE COMPLICATIONS ?



Saignements excessifs (2 à 3 serviettes hygiéniques remplies par heure pendant plus de 2 à 3 heures de suite) ☹️☹️☹️+



Forte fièvre (plus de 39°), ou 38° pendant plus de 24 heures ⌚+



Fortes douleurs qui ne disparaissent pas malgré les antidouleurs et persistent plusieurs jours après la prise des médicaments.



Pertes vaginales anormales et malodorantes

QUE FAIRE EN CAS DE COMPLICATIONS ?



Aller immédiatement dans un centre de santé.

Si une femme a besoin de soins médicaux, le personnel de santé est obligé de la prendre en charge. Les traitements des complications d'un avortement médicamenteux sont exactement les mêmes que dans le cas d'une fausse couche. **Il est impossible de faire la différence entre une fausse couche et un avortement avec la mifepristone et le misoprostol.** La femme qui a besoin de soins médicaux peut donc dire qu'elle fait une fausse couche.

