



EFFICACITE

DES MEDICAMENTS

La méthode combinée Mifepristone / Misoprostol est sûre et efficace dans 95 à 98% des cas durant les 12 premières semaines de grossesse.

QUE FAIRE SI L'AVORTEMENT N'A PAS EU LIEU?



La femme peut répéter la prise des médicaments mifepristone et misoprostol ou recourir à une aspiration. Il y a très peu de risques de malformations du fœtus si la grossesse continue après la prise du médicament.



ORGANIZATIONAL INFORMATION

Women HelpWomen

WEB: [HTTPS://WOMENHELP.ORG/](https://womenhelp.org/)

EMAIL: [INFO@WOMENHELP.ORG](mailto:info@womenhelp.org)

TWITTER: [@WOMENHELPORG](https://twitter.com/womenhelporg)

FACEBOOK: [WOMENHELPWOMENINTERNATIONAL](https://www.facebook.com/womenhelpwomeninternational)

MAMA Network: Mobilizing Activists around Medical Abortion (MAMA).

WEB: [WWW.MAMANETWORK.ORG](http://www.mamanetwork.org)



MON AVORTEMENT A-T-IL REUSSI?

Même si la femme sent qu'elle n'est plus enceinte, il est important de s'assurer que l'avortement a réussi. Il faut faire une échographie après l'avortement médicamenteux, ou un test de grossesse 3 à 4 semaines après l'avortement.



Si la femme **ne saigne pas**, a **peu de saignements** (moins que la menstruation et sans caillots) et/ou **continue à avoir des symptômes de grossesse** après avoir utilisé les médicaments, il est probable qu'elle soit toujours enceinte. **Elle doit faire une échographie** dès que possible pour vérifier si la grossesse poursuit ou pas, si cela n'est pas possible, elle peut utiliser les médicaments à nouveau.



APRES L'AVORTEMENT



Après l'avortement, une femme peut continuer à saigner légèrement pendant 1 à 3 semaines, mais chaque femme est différente.



Il ne faut rien introduire à l'intérieur du vagin (tampons), ni prendre de bain ou avoir des relations sexuelles jusqu'à ce que les saignements abondants diminuent, environ 2 jours après l'avortement médicamenteux.



Une femme peut tomber enceinte immédiatement après un avortement! Pour éviter de tomber enceinte immédiatement, si elle ne le souhaite pas, il faut utiliser un bon moyen de contraception.





COMMENT ÇA MARCHE?

L'avortement médicamenteux induit un processus similaire à une fausse couche.



La Mifepristone bloque la progestérone, une hormone importante pour que la grossesse se poursuive, et permet à l'utérus d'être plus réceptif au Misoprostol.



Le Misoprostol provoque des contractions de l'utérus, qui causent l'expulsion des tissus de la grossesse, de caillots et des saignements.

JUSQU'A QUAND PEUT-IL ETRE UTILISE POUR UN AVORTEMENT SECURISE?



0 >>> 12 semaines

Dans les 12 premières semaines de la grossesse en comptant depuis le premier jour des dernières règles.



COMMENT UTILISER LES MEDICAMENTS POUR UN AVORTEMENT SUR?



La femme aura besoin d'un (1) comprimé de Mifepristone 200 mcg et quatre (4) comprimés de Misoprostol de 200 mcg chacun



La Mifepristone doit être avalé avec un verre d'eau.

24 heures plus tard, placer **4 comprimés de Misoprostol**



sous la langue, **deux comprimés de chaque côté.**

Les 4 comprimés doivent être gardés dans la bouche durant 30 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dissous. Après ce temps, la femme peut avaler les restes.



POSSIBLES EFFETS SECONDAIRES



Dans les 24 heures après la prise des médicaments, les symptômes suivants peuvent survenir: nausées, vomissements, diarrhée, fièvre de 38°, maux de tête et/ou malaises. Ces effets secondaires ne sont pas dangereux et disparaîtront après quelques heures.



QUE PEUT-IL SE PASSER APRES LA PRISE DU MISOPROSTOL?



De fortes crampes et des saignements plus importants que ceux des règles.



Dans 90% des cas, l'expulsion de la grossesse se fait dans les premières 6 heures.



Plus une grossesse est avancée, plus les saignements peuvent être abondants.



Les antidouleurs peuvent être pris au même temps que le misoprostol. **L'ibuprofène** est le plus efficace. Le **paracétamol/acétaminophène** peut être utilisé en complément.



QUELS SONT LES SIGNES DE COMPLICATIONS?



Saignements excessifs (2 à 3 serviettes hygiéniques remplies par heure pendant plus de 2 à 3 heures de suite)



Forte fièvre (plus de 39°, ou 38° pendant plus de 24 heures)



Fortes douleurs plusieurs jours après la prise des médicaments et qui ne sont pas soulagées malgré la prise d'antidouleurs



Pertes vaginales anormales et malodorantes

QUE FAIRE EN CAS DE COMPLICATIONS?



Aller immédiatement dans un centre de santé.

Si une femme a besoin de soins médicaux, **le personnel de santé est obligé de la prendre en charge à temps.** Les traitements des complications d'un avortement médicamenteux sont exactement les mêmes que dans le cas d'une fausse couche. **Il est impossible de faire la différence entre une fausse couche et un avortement avec la mifepristone et le misoprostol.** La femme qui a besoin de soins médicaux **peut donc dire qu'elle fait une fausse couche.**

