



## NGUVU YA DAWA



MISO inafanya kazi ya kutowa mimba kwa wanawake kenda (9) kati ya kumi (10).

## NINI IFANYIKE IKIWA MIMBA AIKUTOKA?



Mwanamuke anaweza kurudiliya kutumiya dawa ao kutumiya mutindo wa kununusa mimba (aspiration). Kuna hatari ndogo sana ya ulemavu wa fetasi (fœtus) ikiwa mimba inaendeleya kisha kutumiya dawa.



## Women HelpWomen

**WEB:** [HTTPS://WOMENHELP.ORG/](https://WOMENHELP.ORG/)

**EMAIL:** [INFO@WOMENHELP.ORG](mailto:INFO@WOMENHELP.ORG)

**TWITTER:** @WOMENHELPORG

**FACEBOOK:** WOMENHELPWOMENINTERNATIONAL

**MAMA Network: Mobilizing Activists around Medical Abortion (MAMA).**

**WEB:** [WWW.MAMANETWORK.ORG](http://WWW.MAMANETWORK.ORG)



## JE, MIMBA YANGU IMEFANYIKIWA KUTOKA?

Hata ikiwa mwanamke anajihisi/jisikia kwamba hana tena mimba, ni muhimu kuhakikisha kama kweli mimba ilitoka. Inabidi kufanya kipimo cha echographia, baada ya kutowa mimba kwa njia ya vidonge, au kipimo cha mimba baada ya wiki/inga 3 au 4 kwa kuhakikisha kama ilitoka kweli kweli.



Ikiwa mwanamuke hatoki damu, anatoka damu kidogo (kuliko munzunguuko wa hedhi na hana mabonge ya mimba) na / ao dalili za mimba zaendeleya baada ya kukunywa dawa, ya wezekana mimba yaendeleya. Ni vema afanye ultrasound échographie haraka iwezekanavyo kwa kuhakikisha kama mimba yaendelleya ao apapa, ikiwa mimba yaendeleya anaweza tena kukunywa dawa kwa mara ingine.



## BAADA YA KUTOA MIMBA



Baada ya mimba kutoka, mwanamke anaweza kuendelea kuvuja/ kutoka damu kidogo kidogo kwa mda wa juma 1 au 3, lakini inafuatana na hali (umbo) ya mwanamke. Ya maana (inabidi) ni kuhakikisha kama mimba inatoka bila tatizo.



Aupashwi kuingiza kitu chochote kile ndani ya uchi ya mwanamke wako (mfano pamba) au kufanya ile bain ya zaidi, au kufanya tendo la ndoa na mwanamme, hadi (mpaka) ile damu iwe yenyé kupunguka karibuni siku mbili (2) hivi kisha mimba kutoka.



**Mwanamke anaweza pata ingine mimba palepale baada mimba kutoka!** Kwa kuepuka kubeba mimba ya haraka baada ya mimba kutoka, inabidi kutumia dawa za kuzuhiya kubeba mimba.

## CONTACTS



**ANWANI:** SOSFEC: DR/C/SUD\_KIVU/UVIRA: QUARTIER KILIBULA AVEC LUNGHE III N° 35.

**SIMU:** +(243) 851728555, 976678719

**FACEBOOK:** SOSFEC ASBL

**EMAIL:** NTURRUBIKAINDI@GMAIL.COM / SOSFEMME.ENFANT@GMAIL.COM



## UTOWAJI MIMBA KWA KUTUMIA MISOPROSTOLI



## MISOPROSTOLI, NI NINI ?

Ni dawa ambayo inatumikishwa duniani kote kwa ajili ya utowaji mimba yenye uhakika pia kutunza vidonda vya estomac. Ina uzishwa kwenye ma duka za dawa (pharmacies) -ikiitwa kwa majina ya uchuuzi ifuatayo: Cytotec, Isovent, Misoclear, MisoFem, Cyrux ao Tomispral. Ndani ya inchi nyngi za africa, imeandikwa kwa ajili yaku kinga na inatunza kotokwa kwa damu nyngi baada ya mwanamke kuzaa - (Hémorragie Post Partum)





## MISOPROSTOLI

### MATUMIZI

kutowa mimba kwa kutaka na uhakika Matunzo baada ya mimba kutoka ao kuaribika (kwa kusaidiya mimba yenye aikutoka vizuri) Kukinga na kutunza kuvuya damu nyangi kisha kuzaa (kutoka damu nyangi kisha kuzaa) Kutunza kidonda cha estomac.

### INATUMIKA NAMWA GANI?

Misoprostoli inaleta machungu, inaregeza na inapanuwa na kufunguwa njija ya kizazi na kuanzisha michakato sawa na kuaribika kwa mimba.

### MPAKA WAKATI GANI INAWEZA KWA AJILI YA KUTOWA TUMIWA MIMBA KWA UHAKIKA ?



12 WIKI

Munamo inga kumi na mbili (12) ya mimba, tangiya siku ya kwanza ya muzunguuko wa hedhi wa mwisho.



## NAMNA GANI UTATUMIYA MISOPROSTOLI KWA KUTOA MIMBA KWA UHAKIKA ?



Mwanamke ana lazima ya vidonge (vinini) 12 kwa jumla, akitumia mara tatu (3), yaani vidonge (vinini) 4 baada ya saa 3.



Tiya vodinge (vinini) 4 ya misoprostoli chini ya lulimi yako



mu dakika 30  
Usimeze, acha visagike.



kisha saa 3, tia vingine vidonge (vinini) 4 chini ya lulimi yako



Muda wa dakika 30  
Usimeze, acha visagike.



Kisha tena saa 3, tia yingine vidonge (vinini) 4 chini ya lulimi wako



Muda wa dakika 30  
Usimeze, acha visagike.



Kama baada ya ma saa tatu (3h), mimba haitoki, baada ya saa tatu (3h) tena, mwanamuke anaweza tena kkunywa dawa mupaka kurushwa kwa mimba.



### KUTATOKEYA NINI KISHA KUTUMIA MISOPROSTOLI?



Kiuno kitapata ganzi kubwa (cramps) na kutoka damu nyangi kuliko damu ya kawaida ya mwezi.



Kwa 80% ya watu, mimba hutoka kwa muda masaa 24 ya mwanzo.



Jinsi mimba inakoma zaidi, ndivyo hiyyo mwanamke atavuja damu.



Dawa zakutuliza maumivu zaweza kukamatiwa kwa kiwango cha mwazo pamoja na Misoprostol. **Ibuprofen** ya saidiya zaidi piya, **paracetamol** ya wezwa kuhongezwa.



### UWEZEKANO WA VINYUME VINGINE



Kwa muda wa masaa 24 kisha kutumia vidonge, hali kama hii inaweza ikafike : kichefuchefu, kutapika, -kuharisha, homa ya 38°, kichwa kuuma ao mchoko. hali hizi siyo za kusumbua sana na zinamalizika kwa masaa fulani.



### ALAMA FULANI ZA KUTATANISHA?



Kutoka damu kupita kiasi (mpaka kunajaza cotexte 2 au 3 kwa saa moja munapo saa 2 au 3 ya kufuatana)



Homa kali (39°) au 38° zaidi



Maumivu makali isiyomalizika ijapokuwa unakunywa dawa za kupunguza maumivu siku za kufuatana baada ya kukamata dawa.



Kutokwa na vitu vibaya ndani ya uchi na vyenye harufu mbaya.



### IFANYIKE NINI IKIWA KUNA MATATIZO



**Wende mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu**

Ikiwa mwanamke ana lazima ya matunzo, mganga anapashwa kumtunza. Matunzo ya utoaji mimba kwa njia ya vidonge iliyoababisha matatizo inalingana moja kwa moja (sawasawa) na yale ya mimba kuaribika. Ni vigumu kutofautisha mimba ambayo imearibika na ambayo ilitoka kupitia vidonge vya Mifepristone na Misoprostol. Inamaana kwamba mwanamke anapokuwa na lazima ya matunzo anawezasema kama mimba iliaribika/ilitoka.