



EFFICACITÉ

DES MÉDICAMENTS

La méthode combinée Mifepristone / Misoprostol est sûre et efficace dans 95 à 98% des cas durant les 10 premières semaines de grossesse et **sans que des soins médicaux additionnels ne soient nécessaires.**

QUE FAIRE SI L'AVORTEMENT N'A PAS EU LIEU ?



La femme peut répéter la prise des médicaments mifeprestone et misoprostol ou recourir à une aspiration.

Il y a très peu de risques de malformations du fœtus si la grossesse continue après la prise du médicament.



MON AVORTEMENT A-T-IL RÉUSSI ?

Même si la femme sent qu'elle n'est plus enceinte, il est important de s'assurer que l'avortement a réussi. Il faut faire une échographie après l'avortement médicamenteux, ou un test de grossesse 3 à 4 semaines après l'avortement.



APRÈS L'AVORTEMENT



Après l'avortement, une femme peut continuer à saigner légèrement pendant 1 à 3 semaines, mais chaque femme est différente. Il faut confirmer que l'avortement est réussi.



Il ne faut rien introduire à l'intérieur du vagin (tampons), ni prendre de bain ou avoir des relations sexuelles jusqu'à ce que les saignements abondants diminuent, environ 2 jours après l'avortement médicamenteux.



Une femme peut tomber enceinte immédiatement après un avortement!

Pour éviter de retomber enceinte immédiatement, si elle ne le souhaite pas, il faut utiliser un bon moyen de contraception.



CONTACTS

Women Help Women
WEB: [HTTPS://WOMENHELP.ORG/](https://womenhelp.org/)
EMAIL: [INFO@WOMENHELP.ORG](mailto:info@womenhelp.org)
TWITTER: [@WOMENHELPORG](https://twitter.com/womenhelporg)
FACEBOOK: [WOMENHELPWOMENINTERNATIONAL](https://www.facebook.com/womenhelpwomeninternational)

MAMA Network: Mobilizing Activists around Medical Abortion (MAMA).
WEB: [WWW.MAMANETWORK.ORG](http://www.mamanetwork.org)

AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX

AVEC MIFEPRISTONE
PLUS MISOPROSTOL
(METHODE COMBINEE)





COMMENT ÇA MARCHE ?

Le Misoprostol induit un processus similaire à une fausse couche.



MIFEPRISTONE **MISOPROSTOL**
La Mifepristone bloque la progestérone, une hormone indispensable pour que la grossesse se poursuive, et permet à l'utérus d'être plus réceptif au Misoprostol.



Le Misoprostol provoque des contractions de l'utérus, qui causent l'expulsion des tissus de la grossesse, de caillots et des saignements.

JUSQU'À QUAND PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ POUR UN AVORTEMENT SÛR ?



0 >>> 10 weeks

Dans les 10 premières semaines de la grossesse en comptant depuis le premier jour des dernières règles.



COMMENT UTILISER LES MÉDICAMENTS POUR UN AVORTEMENT SÛR ?



La femme aura besoin d'un (1) comprimé de Mifepristone 200 mcg et quatre (4) comprimés de Misoprostol de 200 mcg chacun



La Mifepristone doit être avalé avec un verre d'eau.

24 heures plus tard, placer **4 comprimés de Misoprostol** par voie buccale



entre la gencive et la joue, **deux comprimés du côté gauche entre la gencive et la joue et deux comprimés du côté droit entre la gencive et la joue.**

Les 4 comprimés doivent être gardés dans la bouche durant 30 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dissous. Après ce temps, la femme peut avaler les restes



POSSIBLES EFFETS SECONDAIRES

Dans les 24 heures après la prise des médicaments, les symptômes suivants peuvent survenir: nausées, vomissements, diarrhée, fièvre de 38°, maux de tête et/ou malaises. Ces effets secondaires ne sont pas dangereux et disparaîtront après quelques heures.



QUE PEUT-IL SE PASSER APRES LA PRISE DU MISOPROSTOL ?

De fortes crampes et des saignements plus importants que ceux des règles.

Dans 90% des cas, **l'expulsion de la grossesse** se fait dans les premières 24 heures.

Plus une grossesse est avancée, plus la femme aura des saignements.



La femme peut prendre de l'Ibuprofen ou du panadol pour soulager la douleur.



QUELS SONT LES SIGNES DE COMPLICATIONS ?



Saignements excessifs (2 à 3 serviettes hygiéniques remplies par heure pendant plus de 2 à 3 heures de suite)



Forte fièvre (plus de 39°, ou 38° pendant plus de 24 heures)



Fortes douleurs qui ne disparaissent pas malgré les antidouleurs et persistent plusieurs jours après la prise des médicaments.



Pertes vaginales anormales et malodorantes

QUE FAIRE EN CAS DE COMPLICATIONS ?



Aller immédiatement dans un centre de santé.

Si une femme a besoin de soins médicaux, **le personnel de santé est obligé de la prendre en charge.** Les traitements des complications d'un avortement médicamenteux sont exactement les mêmes que dans le cas d'une fausse couche. **Il est impossible de faire la différence entre une fausse couche et un avortement avec la mifepristone et le misoprostol.** La femme qui a besoin de soins médicaux **peut donc dire qu'elle fait une fausse couche.**

