



## EFFICACITE DU MEDICAMENT



Le Misoprostol fonctionne pour interrompre une grossesse chez 9 femmes sur 10.

## QUE FAIRE SI L'AVORTEMENT N'A PAS EU LIEU?



La femme peut répéter la prise du médicament ou recourir à une aspiration.  
Il y a très peu de risques de malformations du fœtus si la grossesse continue après la prise du médicament.



Women HelpWomen  
WEB: [HTTPS://WOMENHELP.ORG/](https://womenhelp.org/)  
EMAIL: [INFO@WOMENHELP.ORG](mailto:info@womenhelp.org)  
TWITTER: @WOMENHELPORG  
FACEBOOK: WOMENHELPWOMENINTERNATIONAL

MAMA Network: Mobilizing Activists around Medical Abortion (MAMA).  
WEB: [WWW.MAMANETWORK.ORG](http://www.mamanetwork.org)



## MON AVORTEMENT A-T-IL REUSSI?

Même si la femme sent qu'elle n'est plus enceinte, il est important de s'assurer que l'avortement a réussi. Il faut faire une échographie après l'avortement médicamenteux, ou un test de grossesse 3 à 4 semaines après l'avortement.



Si la femme **ne saigne pas**, a **peu de saignements** (moins que la menstruation et sans caillots) et/ou **continue à avoir des symptômes de grossesse** après avoir utilisé les médicaments, il est probable qu'elle soit toujours enceinte. **Elle doit faire une échographie** dès que possible pour vérifier si la grossesse poursuit ou pas, si cela n'est pas possible, elle peut utiliser les médicaments à nouveau.



## APRES L'AVORTEMENT



Après l'avortement, une femme peut continuer à saigner légèrement pendant 1 à 3 semaines, mais chaque femme est différente.



Il ne faut rien introduire à l'intérieur du vagin (tampons), ni prendre de bain ou avoir des relations sexuelles jusqu'à ce que les saignements abondants diminuent, environ 2 jours après l'avortement médicamenteux.



**Une femme peut tomber enceinte immédiatement après un avortement!** Pour éviter de retomber enceinte immédiatement, si elle ne le souhaite pas, il faut utiliser un bon moyen de contraception.

## AVORTEMENT MEDICAMENTEUX AVEC LE MISOPROSTOL



## LE MISOPROSTOL, QU'EST-CE QUE C'EST ?

C'est un médicament utilisé dans le monde entier pour provoquer sursurés des avortements sûrs et traiter des ulcères gastriques. Il est vendu en pharmacie sous les noms commerciaux suivants: Cytotec, Isovent, Misoclear, MisoFem, Cyrux ou Tomispral. Dans la majorité des pays Africains, il est enregistré pour prévenir et traiter les saignements excessifs après l'accouchement (Hémorragie Post Partum).





## MISOPROSTOL,

### POUR QUEL USAGE?

Avortement sécurisé.  
Soins post-avortement ou après fausse couche (pour traiter un avortement incomplet).  
Prévention et traitement de l'hémorragie post-partum (HPP - saignements excessifs après l'accouchement).  
Traitement de l'ulcère gastrique.

### COMMENT ÇA MARCHE?

Le Misoprostol provoque des contractions utérines, ramollie et dilate le col de l'utérus, ce qui déclenche un processus similaire à une fausse-couche.

### JUSQU'À QUAND PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ POUR UN AVORTEMENT SÉCURISÉ?



12 SEMAINES

Dans les 12 premières semaines de grossesse en comptant depuis le premier jour des dernières règles.



### COMMENT UTILISER LE MISOPROSTOL POUR UN AVORTEMENT SUR ?



Une femme a besoin de 12 comprimés de misoprostol, il doit être pris en doses de 4 comprimés toutes les 3 heures:




Mette 4 comprimés de misoprostol sous la langue pendant 30 minutes



ne pas avaler, laissez dissoudre




Après 3 heures, mettre 4 autres comprimés sous la langue pendant 30 minutes



ne pas avaler, laissez dissoudre



Après 3 heures, mettre 4 autres comprimés sous la langue pendant 30 minutes



ne pas avaler, laissez dissoudre



**Si 3h plus tard l'avortement n'a pas eu lieu, la femme peut utiliser des doses supplémentaires toutes les 3 heures jusqu'à l'expulsion.**



### QUE VA-T'IL SE PASSER APRES LA PRISE DU MISOPROSTOL ?



Des crampes et des saignements plus importants que ceux des règles.



Dans 80% des cas, **l'expulsion de la grossesse** se fait dans les premières 24 heures.



Plus une grossesse est avancée, plus la femme aura des saignements.



Les antidouleurs peuvent être pris au même temps que la première dose de misoprostol. **L'ibuprofène** est le plus efficace. Le **paracétamol/acétaminophène** peut être utilisé en complément.



### POSSIBLES EFFETS SECONDAIRES



Dans les 24 heures après la prise des médicaments, les symptômes suivants peuvent survenir: nausées, vomissements, diarrhée, fièvre de 38°, maux de tête et/ou malaises. Ces effets secondaires ne sont pas dangereux et disparaîtront après quelques heures.



### QUELS SONT LES SIGNES DE COMPLICATIONS?



Saignements excessifs (2 à 3 serviettes hygiéniques remplies par heure pendant plus de 2 à 3 heures de suite)



Forte fièvre (plus de 39°), ou 38° pendant plus de 24 heures



Douleurs intenses plusieurs jours après l'avortement et qui ne sont pas soulagées par les antidouleurs.



Pertes vaginales anormales et malodorantes

### QUE FAIRE EN CAS DE COMPLICATIONS?



**Aller immédiatement dans un centre de santé.**

Si une femme a besoin de soins médicaux, **le personnel de santé est obligé de la prendre en charge.** Les traitements des complications d'un avortement médicamenteux sont exactement les mêmes que dans le cas d'une fausse couche. **Il est impossible de faire la différence entre une fausse couche et un avortement avec du misoprostol.** La femme qui a besoin de soins médicaux **peut donc dire qu'elle fait une fausse couche.**

