



## የመድኃኒቱ ውጤታማነት



ሚሶፕሮስቶል የመድሀኒት እንክብል ያለተጨማሪ የሕክምና እንክብካቤ እርግዝናን ለማቋረጥ የሚያስፈልግ እንክብል ሲሆን መድሀኒቱን ከተጠቀሙት ከ10 ሴቶች ውስጥ በ8ቱ ላይ ውጤታማ በመሆን ይታወቃል።

## መድሀኒቱ ካልሰራ የምናደርገው፡-



የሚሶፕሮስቶልን መጠን በመደገም ወይም በመሳሪያ የታገዘ ፅንሰ የማቋረጥ ሂደት (Manual Vacuum Aspiration) በመጠቀም ፅንሱን ማቋረጥ።

ሚሶፕሮስቶልን ከወሰዱ በኋላ እርግዝናው የሚቀጥል ከሆነ በሚወለደው ህፃን ላይ ትንሽ የጤና እክል ይገጥማል።



## ፅንሰ የማቋረጥ ሂደቱ የተሳካ ይሆን?

አንዲት ሴት እርግዝ እንዳልሆነች ከተሰማት ፅንሰ የማቋረጥ ሂደቱ የተሳካ መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። በህክምና ፅንሱን ካቋረጠችበት ጊዜ አንስቶ ከ3 እስከ 4 ሳምንታት ባለው ጊዜ ውስጥ የእርግዝና ምርመራ ወይም የአልትራሳውንድ ምርመራ ማድረግ አለባት።



## ፅንሱ ከተቋረጠ በኋላ



አንዲት ሴት ፅንሱ ከተቋረጠ በኋላ ከ1 እስከ 3 ሳምንታት ቀላል የደም መፍሰስ ሊያጋጥማት ይችላል ነገር ግን እያንዳንዱ ሴት ላይ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በኋላም ፅንሰ የማቋረጥ ሂደቱ የተሳካ መሆኑን ማረጋገጥ አለባት።



በዚህ ወቅት ሴቶች ምንም ነገር ወደ ብልታቸው ውስጥ እንዳያስገቡ ይመከራሉ። የወር አበባን ደም ለመምጠጥ በሴት ብልቱ ውስጥ የተገጠመ ለስላሳ ቆሳቆስም ቢሆን መጠቀም የለባቸውም። የመድኃኒት ፅንሰ ማቋረጫ እንክብል ከተጠቀሙ በኋላ ከባድ የደም መፍሰስ አስከቆም ድረስ ለ2 ቀናት ያህል በውሃ መዘፍዘፍ ወይም የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማድረግ የለባቸውም። ምክንያቱም የማህፀን ጫፍ ከፍት ሆኖ ስለሚቆይ ለበሽታ የመጋለጥ እድሏ ከፍተኛ ነው።



## አንዲት ሴት ፅንሱ ከተቋረጠ በኋላ ወዲያውኑ ማርገዝ ትችላለች!

ወዲያውኑ ለማርገዝ ካልፈለገች አንዲሁም ያልተፈለገ እርግዝናን ለመከላከል ጥሩ እና አስተማማኝ የእርግዝና መከላከያ ዘዴን መጠቀም መጀመር ትችላለች።



## ORGANIZATIONAL INFORMATION

Women Help Women

WEB: [HTTPS://WOMENHELP.ORG/](https://womenhelp.org/)

EMAIL: [INFO@WOMENHELP.ORG](mailto:info@womenhelp.org)

TWITTER: @WOMENHELPORG

FACEBOOK: WOMENHELPWOMENINTERNATIONAL

MAMA Network: Mobilizing Activists around Medical Abortion (MAMA).

WEB: [WWW.MAMANETWORK.ORG](http://WWW.MAMANETWORK.ORG)

ሚሶፕሮስቶል  
እንክብልን  
በመጠቀም  
የሚደረግ የሕክምና  
ፅንሰ የማቋረጥ



## ሚሶፕሮስቶል ምንድን ነው?

ሚሶፕሮስቶል የመድሀኒት እንክብል እርግዝናን ለማቋረጥ እና የጨጓራ ቁስለትን ለማከም በመላው አለም ጥቅም ላይ የሚውል መድሀኒት ነው። በፋርማሲዎች ውስጥ በ “ሳይቶቴክ, አይዘቬንት, ሚሶክላር, ሚሶፌም, ሳይቶክስ ወይም ቶሚስፓል” ስም ይሸጣል። በአብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት ይህ መድሀኒት የተመዘገበው እናቶች ልጅ ከወለዱ በኋላ የሚገጥማቸውን ከባድ የደም መፍሰስን ለማከም እና ለመከላከል በሚል ነው።





## ሚሶፕሮስቶል

### በምን ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል?

ከፅንሰ መጨነገፍ ወይም ፅንሰን ካቋረጡ በኋላ የሚወሰድ ሲሆን (ያላለቀ የፅንሰ ማቋረጥን ለማጠናቀቅም ይጠቅማል)፡፡ እንዲሁም ከወሊድ በኋላ የሚከሰት ከባድ የደም መፍሰስን ለመከላከል እና ለማከም ይውላል፡፡

በተጨማሪም የጨጓራ ቁስለትን ለማከም ይረዳል፡፡

### እንዴት ነው የሚሰራው?

ሚሶፕሮስቶል ከተፈጥሯዊ የፅንሰ መጨነገፍ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሂደትን ይከተላል፡፡ የማህፀን ጫፍን በማለስለስ እና በመክፈት ማህፀን እንዲወጣ እና ፅንሱን በመግፋት ያለጊዜው እንዲወጣ ያደርጋል፡፡

### ደህንነቱ የተጠበቀ ፅንሰን ለማቋረጥ መቼ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል?



በመጨረሻው የወር አበባ ዑደት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በእርግዝና የመጀመሪያዎቹ 9 ሳምንታት ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል ይችላል፡፡



ከ 9 ሳምንታት በኋላ ከሆነ ግን በሕክምና ክትትል ስር መድሀኒቱን እንዲጠቀሙ ይመከራል፡፡



### ደህንነቱ የተጠበቀ ፅንሰን ለማቋረጥ ምን ሂደቶችን መከተል ያስፈልጋል?



እንዲት ሴት በአጠቃላይ 12 እንክብሎች ያስፈልጋታል እናም በየ 3 ሰዓቱ በ 3 ዶዝ ወይም ለ3 ጊዜ ያህል 4 እንክብል እንድትወስድ ይደረጋል፡፡



የሚሶፕሮስቶል እንክብሎችን ከምላስ ስር ለ 30 ደቂቃ ያህል



ከ 3 ሰዓታት በኋላ

ማስቀመጥ ከዛም ሳይዋጥ በአፍ ውስጥ እንዲሟሟ ማቆየት/ ማድረግ



ከ 3 ሰዓታት በኋላ ሌላ 4 እንክብሎችን ከምላስ ስር ለ 30 ደቂቃ ያህል



ከ 3 ሰዓታት በኋላ

ማስቀመጥ ከዛም ሳይዋጥ በአፍ ውስጥ እንዲሟሟ ማቆየት/ ማድረግ



ከ 3 ሰዓታት በኋላ ሌላ 4 እንክብሎችን ከምላስ ስር ለ 30 ደቂቃ ያህል



ከ 3 ሰዓታት በኋላ

ማስቀመጥ ከዛም ሳይዋጥ በአፍ ውስጥ እንዲሟሟ ማቆየት/ ማድረግ



### መድሃኒቱን ከተጠቀሙ በኋላ ምን ሊጠበቅ/ ሊከሰት ይችላል?



በወር አበባቸው ወቅት ከሚከሰተው በላይ ከፍተኛ ቁርጠት እና የሴት ብልት ደም መፍሰስ ይከሰታል፡፡



80 በ100 በሚሆኑ ተመሳሳይ ክስተቶች መድሃኒቱ ከተወሰደ በመጀመሪያዎቹ 24 ሰዓታት ውስጥ ፅንሱ የመቋረጥ ሂደት ይጀምራል፡፡



የእርግዝና ጊዜዋ በረዘመ ቁጥር ከፍተኛ የደም መፍሰስ እና ቁርጠት ሊኖረው ይችላል፡፡



ህመሙን ለማስታገስ የማስታገሻ እንክብሎችን ለምሳሌ፡- አቡፕሮፈን ወይም ፓናዶል (ibuprofen or Panadol) መጠቀም ትችላለች



### ሊከሰቱ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳዮች



በመጀመሪያዎቹ 24 ሰዓታት ውስጥ የሚከተሉት ምልክቶች ሊከሰቱ ይችላሉ፡፡ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ ተቅማጥ፣ ትኩሳት፣ ብርድ ብርድ የሚል ትኩሳት፣ ራስ ምታት ወይም ማዞር እና መፍዘዝ ናቸው፡፡ እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳዮች አደገኛ የሚባሉ አይደሉም እንዲሁም በጥቂት ሰዓታት ውስጥ የሚጠፋ ናቸው፡፡



### የአደገኛ ወይም የማስጠንቀቂያ ምልክቶች (ውስብስብ ችግሮች) ምንድናቸው?



ከመጠን በላይ ደም መፍሰስ (2 ወይም 3 የወር አበባ የንፅህና መጠበቂያ/ሞዴስ ለተከታታይ ለ2 ወይም 3 ሰዓታት በላይ መጠቀም)፡፡



ከፍተኛ ትኩሳት (ከ 38 ወይም 39 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ) የሆነ የሰውነት መቀት ከ24 ሰዓታት በላይ መቆየት፡፡



መድሃኒቱን ከወሰዱ ከጥቂት ቀናት በኋላ በህመም ማስታገሻዎች የማይጠፋ ከፍተኛ ህመም መስማት፡፡



ያልተለመደ እና ሽታ ያለው፣ የሴት ብልት ፈሳሽ መኖር፡፡

### አደገኛ ወይም ውስብስብ ችግሮቹ ሲኖሩ ምን ማድረግ ይጠበቅብዎታል?



### ውዲያውኑ ወደ ጤና ጣቢያ ይሂዱ፡፡

የሕክምና ድንገተኛ አደጋ በሚከሰትበት ጊዜ የሕክምና ባለሙያዎች ግለሰቧን በጊዜው የመርዳት ግዴታ አለባቸው፡፡ በሕክምና ፅንሰን ካቋረጡ በኋላ የሚኖረው ውስብስብ ችግሮች በፅንሰ መጨነገፍ ከሚመጡ ችግሮች ጋር ተመሳሳይ ናቸው፡፡ በተፈጥሮ ፅንሰ መጨነገፍ እና በሚሶፕሮስቶል ፅንሰ ማቋረጥ መካከል ያለውን ልዩነት መለየት አይቻልም፡፡ በመሆኑም የሕክምና እንክብካቤ የሚያስፈልጋት ሴት ለህክምና ባለሙያዎቹ የፅንሰ መጨነገፍ እንደጀመረች ልትናገር ትችላለች፡፡

